

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

PHILS-LIN

SĐK: VD-19709-13

■ **THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: L-cystine 500 mg

Tá dược: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, dầu lecithin, gelatin, glycerin đậm đặc, D-Sorbitol 70%, ethyl vanillin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, nước tinh khiết.

■ **DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm.

■ **CHỈ ĐỊNH**

Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp:

- Viêm da do thuốc.
- Sạm da, tàn nhang, sạm nắng.
- Eczema, mề đay, phát ban da, mụn trứng cá.
- Các bệnh biểu bì làm móng tóc khô giòn dễ gãy.

■ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn: Liều dùng thông thường là 2-4 viên/ ngày.

Có thể dùng liên tục PHILS-LIN trong thời gian 10-20 ngày mỗi tháng.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Bệnh nhân quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

■ **THẬN TRỌNG**

Thận trọng

- Nếu xảy ra buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, ngứa, chán ăn và khó chịu ở bụng, nên ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.
- Tuân theo đúng liều dùng được đề nghị.
- Trong trường hợp dùng thuốc đối với trẻ em phải có sự hướng dẫn của người lớn. Không dùng thuốc này cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Nếu thuốc không có hiệu quả sau khi dùng 2 tuần, ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

Cảnh báo

- Không nên dùng PHILS-LIN cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng và hôn mê gan.
- Nên dùng PHILS-LIN thận trọng ở những bệnh nhân bị cystine niệu.

■ **TƯƠNG TÁC THUỐC**

Chưa có báo cáo.

■ **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thật sự cần thiết và dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sỹ.

■ **ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**

Không ảnh hưởng.

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Chưa có báo cáo.

*** Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

■ **QUÁ LIỀU**

Chưa có báo cáo.

■ **BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

■ **ĐÓNG GÓI:** Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.

Sản xuất theo nhượng quyền của

AHN GOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD., KOREA

Tại: **CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA**

Số 25, Đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore,

Thuận An, Bình Dương.