

PHONG LIỄU TRÀNG VỊ KHANG

Fengliao Changweikang Granules

(Thuốc cốm – có đường)

Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin chi tiết xin hỏi ý kiến bác sỹ.

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 8 g có chứa:

Thành phần hoạt chất: Cao hỗn hợp dược liệu tương đương:

Ngưu nhĩ phong (Herba Daphniphylli calycini)... 20 g

La liễu (Herba Polygoni hydropiperis)..... 10 g

Thành phần tá dược: Sucrose, Dextrin, Natri benzoat vừa đủ.

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc cốm. Cốm màu nâu vàng đến nâu sẫm, vị ngọt.

TÁC DỤNG: Thanh nhiệt, trừ thấp, hóa trệ

CHỈ ĐỊNH:

Dùng cho viêm dạ dày, ruột cấp tính thể ỉa chảy do ngộ độc thức ăn và thể ỉa chảy do thấp nhiệt với các triệu chứng: đau bụng, đầy bụng, ỉa chảy phân thối, buồn nôn, nôn hoặc có sợ lạnh, phát sốt, rêu lưỡi vàng, mạch sắc...

Hoặc có thể dùng trong trường hợp đau dạ dày do tích trệ thức ăn, biểu hiện: đau vùng thượng vị, đau khi ấn, nôn sau khi ăn, ợ hơi, nuốt chua, rêu lưỡi dày nhờn hoặc vàng nhớt, mạch hoạt sắc

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Pha với nước ấm, 1 gói (8g)/lần x 3 lần/ngày. Trường hợp viêm loét niêm mạc dạ dày thường dùng 15 ngày một liệu trình.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Sản phẩm có chứa đường nên thận trọng với bệnh nhân đái tháo đường.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC: Chưa có báo cáo về tương tác thuốc. Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Trong thời gian lưu hành thuốc tại Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2019 ghi nhận được 286 ca phản ứng bất lợi trong tổng số 41.124.887 người sử dụng. Các tác dụng không mong muốn có thể có: phát ban, ngứa, các bệnh về da và mô dưới da khác, buồn nôn, nôn và các rối loạn về đường tiêu hóa khác. Các tác dụng không mong muốn này là hiếm gặp.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

DƯỢC LÝ

Thử nghiệm trên động vật cho thấy sản phẩm này có thể ức chế sự tiết acid dạ dày và dịch dạ dày, đồng thời ức chế đáng kể biên độ và tần suất co bóp hồi tràng ở động vật, ngoài ra nó có tác dụng điều trị tốt trên mô hình viêm dạ dày thực nghiệm ở động vật

BẢO QUẢN: Bảo quản trong gói kín, ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30oC.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 6 gói hoặc 9 gói, mỗi gói 8 g

HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

CƠ SỞ SẢN XUẤT: HAIKOU PHARMACEUTICAL FACTORY CO., LTD.

(XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM – CÔNG TY HỮU HẠN HẢI KHẨU TRUNG QUỐC)

Địa chỉ: No.192, Nanhai Road, Xiuying Dist., Haikou, Hainan, China

(Số 192, đường Nam Hải, quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc).

ĐT: +86-898-68660766/68650115

Fax: +86-898-68653136/68664845

DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Địa chỉ: Lô A2-CN3, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 37832673

Fax: 024 37831676