

SIMENIC®

Viên nang mềm

GMP-WHO

Công thức :

Alverin citrat.....	40 mg
Simethicon.....	100 mg
Tá dược vừa đủ.....	1 viên nang mềm

Cơ chế tác động :

- Simethicon làm giảm sức căng bề mặt các bong bóng hơi, khiến cho chúng kết hợp lại. Nó được sử dụng để loại bỏ hơi, khí hay bọt ở đường tiêu hóa trước khi chụp X-quang và để làm giảm căng bụng và khó tiêu do hơi dư thừa trong đường tiêu hóa.
- Alverin citrate : có tác dụng chống co thắt cơ trơn loại Papaverin, không có tác dụng kiểu Atropin nên có thể sử dụng trong trường hợp tăng nhãn áp hoặc phì đại tuyến tiền liệt.

Chỉ định :

- Điều trị triệu chứng các biểu hiện đau do rối loạn chức năng đường tiêu hóa và đường mật .
- Điều trị các biểu hiện co thắt vùng tiết niệu sinh dục (đau bụng kinh, đau quặn thận và đau đường niệu, do sảy thai).
- Làm giảm các triệu chứng đau bụng do hơi dư thừa trong đường tiêu hóa, trướng bụng.
- Giảm ỏi mửa do trướng khí dạ dày hay rối loạn tiêu hóa.
- Được sử dụng như một chất hỗ trợ cho trị liệu nhiều chứng bệnh có vấn đề tắc nghẽn hơi như nghẽn hơi sau giải phẫu, do nuốt khí, khó tiêu cơ năng, loét dạ dày, kết tràng bị co thắt hay bị kích thích.
- Chuẩn bị cho xét nghiệm X-quang (dạ dày, ruột, túi mật, thận) và trước khi nội soi dạ dày.

Liều dùng :

- Liều thông thường cho người lớn 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần, uống sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ.
- Trẻ em nên theo chỉ dẫn của Bác sĩ.

Chống chỉ định :

- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng :

- Phụ nữ có thai và cho con bú chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.
- Simethicon được khuyến cáo không nên dùng điều trị chứng đau bụng ở trẻ sơ sinh vì có rất ít thông tin về sự an toàn của thuốc đối với trẻ sơ sinh và trẻ em.

Tác dụng không mong muốn của thuốc :

- Có thể gây hạ huyết áp.
- Thuốc có thể gây các phản ứng dị ứng.

Bảo quản : Ở nhiệt độ 20 - 25°C. Tránh ánh sáng.

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Trình bày :

- Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.
- Chai 50 viên, chai 100 viên.

Tiêu chuẩn : NSX.

- ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.
- ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
- NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY THUỐC.
- THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

USA - NIC PHARMA Co., Ltd

Block 11 D - Road C - Tan Tao IP. - Binh Tan Dist - HCMC

Tel : (028) 37.541.999 (5 Lines)

Fax : (028) 37.543.999