

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SIRÔ THUỐC HO



Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

THÀNH PHẦN: Mỗi 125ml sirô chứa:

Thành phần hoạt chất:

Cao lỏng dược liệu60ml

Tương đương với dược liệu:

Bạch linh (*Poria*)0,900g

Cát cánh (*Radix Platycodi grandiflori*)1,708g

Tỳ bà diệp (*Folium Eriobotryae*)3,250g

Mơ muối (*Fructus Armeniacae praeparatus*) ...1,406g

Tang bạch bì (*Cortex Mori albae radices*)1,875g

Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae*)1,875g

Bách bộ (*Radix Stemonae tuberosae*)6,250g

Cam thảo (*Radix et Rhizoma Glycyrrhizae*) 0,591g

Thiên môn đông (*Radix Asparagi cochinchinensis*) ..1,208g

Bạc hà (*Herba Menthae*)1,666g

Xạ can (*Rhizoma Belamcandae chinensis*)0,656g

Bạch phàn (*Alumen*)0,208g

Tinh dầu bạc hà (*Aetheroleum Menthae arvensis*)...0,100g

Thành phần tá dược: Đường trắng, Acid benzoic,

Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Sirô thuốc.

CHỈ ĐỊNH:

Tác dụng: Bổ phế, trừ ho, hóa đờm, tuyên thông phế khí.

Chỉ định: Chuyên trị các trường hợp ho do cảm mạo, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Ngày uống 3 lần.

Trẻ em dưới 6 tuổi: mỗi lần uống 5ml.

Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: mỗi lần uống 10ml.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: mỗi lần uống 15ml.

Đợt thường dùng từ 7 đến 10 ngày hoặc dùng đến khi hết triệu chứng và uống thêm từ 2 - 3 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi.

Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Trong 125ml siro thuốc có chứa khoảng 100g đường, nên lưu ý khi sử dụng thuốc đối với người bị bệnh tiểu đường.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ đang có thai cần thận trọng khi dùng thuốc này.

Thuốc dùng được cho phụ nữ đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Hiện chưa có tài liệu ghi nhận về tương tác của thuốc.

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Hiện tại chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo cho bác sỹ hoặc nhà sản xuất nếu gặp phải tác dụng không mong muốn của thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 lọ x 125ml.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 48 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá 30 ngày sau lần mở nắp lọ đầu tiên.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC: TCCS.



NAMHA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Trụ sở chính: 415 Han Thuyền, P. Vĩ Xuyên, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Nhà máy sản xuất: Lô H10, Đường D5, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tel: 0228.3649408 - Fax: 0228.3644650