

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

Sirô ho **PROSPAN®**

Tiêu chảy - chống co thắt - giảm ho

Không chứa cồn • Không chứa đường
Không chứa phẩm màu

THÀNH PHẦN:

Hoạt chất: Mỗi 2.5 ml dung dịch chứa:

Cao khô lá thường xuân (*Hederae helici folii extractum siccum*) ... 17.5 mg chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5) : 1]

Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbat, acid citric khan, gôm xanthan, hương anh đào, dung dịch sorbitol 70%.

CHỈ ĐỊNH: Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose.

THẬN TRỌNG: Với phụ nữ có thai và cho con bú: Bởi tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Rất hiếm

Phản ứng dị ứng như khó thở, sưng, đỏ da hoặc ngứa có thể xảy ra sau khi sử dụng thuốc có chứa cao khô lá thường xuân.

Không phổ biến

Ở những bệnh nhân nhạy cảm với rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy có thể xảy ra và có thể có tác dụng nhuận tràng do thành phần thuốc có sorbitol.

Lưu ý đặc biệt:

Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Prospan® có thành phần hoạt chất là chất chiết xuất từ thực vật, do đó màu của thuốc đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống thuốc Prospan® cùng với các thuốc khác có gây những tác

dụng không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng Prospan® đồng thời với các thuốc khác, ví dụ như kháng sinh, được xem là an toàn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi): 2,5ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Trẻ ở độ tuổi đi học (6 – 9 tuổi) và thiếu niên (> 10 tuổi): 5ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Người lớn: 5 – 7,5ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Lắc chai kỹ trước khi dùng!

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của các triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuần, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ.

Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng bệnh.

Trong trường hợp bệnh vẫn còn dai dẳng và xuất hiện tình trạng khó thở, sốt, đàm có mủ hoặc máu, phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.

BẢO QUẢN: Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Sau khi mở nắp, thuốc có thể sử dụng trong vòng 90 ngày

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 50ml, 70ml, 75ml, 85ml, 100ml và 200ml.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.


Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em.



Sản xuất bởi:

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH
& Co. KG, Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden - CHLB
Đức

Xuất xứ: CHLB Đức



Nhà nhập khẩu & Phân phối:

Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm & Thương mại Sohaco,
Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội,
Việt Nam.