

Colicare® DROPS

Thành phần: Mỗi ml chứa:

Nhũ tương Simethicone U.S.P

Tương đương với simethicone U.S.P 40 mg

Dill oil B.P 0.005 ml

Fennel oil USP-NF 0.0007 ml

Tá dược : Sucrose, Sodium Methyl Paraben, Sodium Propyl Paraben, Xanthan Gum, Sodium Citrate Dihydrate, Citric Acid Monohydrate.

Dạng bào chế : Nhũ tương để uống.

Quy cách đóng gói : Chai 15 ml

Chỉ định : Điều trị các triệu chứng đầy bụng, chướng bụng trong các bệnh: trào ngược dạ dày thực quản, chứng khó tiêu, giảm cơn đau bụng do co thắt cơ trơn đường tiêu hoá ở trẻ em.

Liều dùng, cách dùng, đường dùng :

Liều dùng:

Trẻ em (dưới 6 tháng) : 5 - 10 giọt, 4 lần mỗi ngày, 15 phút trước khi cho trẻ ăn.

Trẻ em (6 - 12 tháng) : 10 - 20 giọt, 4 lần mỗi ngày, 15 phút trước khi cho trẻ ăn.

Trẻ em (hơn 1 năm) : 20 giọt 4 lần mỗi ngày. 15 phút trước khi cho trẻ ăn.

Hoặc theo chỉ dẫn của Bác sỹ.

Sử dụng ống nhỏ giọt với kích cỡ qui định kèm theo hộp.

Cách dùng : LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG.

Đậy nắp cẩn thận sau khi dùng.

Đường dùng: Uống

Chống chỉ định : Chống chỉ định với bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng khi dùng thuốc :

Chỉ dùng thuốc sau khi loại trừ cơn đau bụng có dấu hiệu ngoại khoa. Nếu nghi ngờ phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Không sử dụng quá 12 liều trong 1 ngày trừ khi có chỉ định và theo dõi của thầy thuốc.

PN mang thai và cho con bú : Thuốc này dùng cho trẻ em.

Lái xe và vận hành máy móc : không ảnh hưởng

Tương tác thuốc : Chưa có tương tác thuốc nào giữa Colicare drops với thuốc khác được báo cáo.

Tác dụng không mong muốn :

Thuốc này an toàn và gần như không gây tác dụng không mong muốn.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Quá liều và cách xử trí

Những thành phần dùng trong công thức Colicare thì được dung nạp tốt.

Trong trường hợp quá liều, ngưng dùng thuốc ngay và tham khảo ý kiến Bác sỹ.

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ"

"Để xa tầm tay trẻ em"

Điều kiện bảo quản : Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sau khi mở nắp nếu thuốc được bảo quản ở Bảo quản dưới 30°C, nơi khô thoáng. Tránh ánh sáng. và nắp được gài chặt sau khi sử dụng thì Colicare drops vẫn giữ được độ ổn định trong 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Sản xuất tại Ấn Độ bởi : MEYER ORGANICS PVT. LTD.

10 D, 2nd Phase, Peenya Ind. Area, Bangalore – 560 058.

Văn phòng. : A-177, Wagle Estate, Thane – 400 604. (Mumbai) ẤN ĐỘ.

Hợp tác kỹ thuật với : Omega-Meyer Ltd. Jersey, British Isles