

Để xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

NUVATS

SDK: VD-26011-16

◆ THÀNH PHẦN:

Hoạt chất:

Mỗi tuýp 5 g kem chứa: Clobetason butyrat2,5 mg

Mỗi tuýp 10 g kem chứa: Clobetason butyrat 5 mg

Tá dược: Parafin lỏng, vaselin, cetyl cetostearyl, propylen glycol, cetomacrogol 1000, methyl paraben, propyl paraben, dầu lavender, nước tinh khiết.

◆ DẠNG BÀO CHẾ: Kem bôi ngoài da.

◆ CHỈ ĐỊNH

Điều trị các dạng chàm (eczema) và viêm da bao gồm:

- Chàm dị ứng.
- Viêm da do tiếp xúc với ánh sáng.
- Viêm tai ngoài.
- Viêm da do kích thích và dị ứng tiên phát (kể cả hăm do tã lót).
- Sẩn ngứa nổi cục.
- Viêm da tiết bã nhờn.
- Các phản ứng do côn trùng đốt.

Điều trị duy trì xen kẽ với các đợt điều trị bằng các steroid tại chỗ mạnh hơn.

◆ LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Bôi NUVATS lên vùng da bị bệnh 1-2 lần/ngày cho đến khi có cải thiện. Sau đó, số lần bôi có thể giảm xuống.

◆ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Nhiễm virus tiên phát (ví dụ: herpes simplex, thủy đậu).
- Các tổn thương da do nhiễm trùng tiên phát bởi nhiễm nấm hoặc vi khuẩn.

◆ CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Nuvats nên dùng thận trọng ở bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với các thuốc chứa corticosteroid khác. Phản ứng quá mẫn có thể giống các biểu hiện của bệnh khi điều trị.

Steroid dùng tại chỗ nếu thuốc hấp thu nhiều qua da vào tuần hoàn có thể gây hội chứng Cushing và ức chế thuận nghịch trục hạ đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận, dẫn đến suy giảm glucocorticosteroid ở một vài bệnh nhân. Nếu có các biểu hiện này nên ngưng thuốc từ từ bằng cách kéo dài khoảng cách dùng thuốc hoặc thay thế bằng thuốc chứa steroid có hoạt lực yếu hơn. Không nên dùng thuốc đột ngột vì có thể dẫn đến suy giảm glucocorticosteroid.

Nuvats có chứa cetyl cetostearyl có thể gây kích ứng tại chỗ (như viêm da tiếp xúc).

Đối với trẻ nhũ nhi và trẻ em, nếu có thể nên tránh điều trị liên tục kéo dài với corticosteroid, thông thường tối đa không quá 7 ngày vì ức chế thượng thận có thể xảy ra, ngay cả khi không băng kín. Ở trẻ nhũ nhi, tã lót có thể có tác dụng như khi băng kín và làm tăng hấp thu.

Cũng như tất cả các corticoid, không nên bôi trên mặt trong thời gian dài vì có thể gây teo da.

Nếu bôi vào mí mắt cần phải thận trọng để đảm bảo thuốc không vào mắt, vì có thể dẫn tới glaucoma.

Không nên sử dụng cùng lúc với các thuốc bôi ngoài da có chứa corticosteroid khác vì có thể làm tăng các tác dụng

không mong muốn.

Khi các tổn thương viêm bị nhiễm trùng, nên dùng kháng sinh thích hợp để điều trị. Khi có dấu hiệu nhiễm trùng lan rộng, cần phải ngừng sử dụng corticosteroid tại chỗ và dùng kháng sinh theo đường toàn thân.

Khi băng kín vùng bôi thuốc, da trở nên ẩm và ẩm sẽ tạo điều kiện cho nhiễm khuẩn phát triển, vì vậy cần làm sạch vùng da trước khi bôi thuốc mới và đặt băng sạch lên trên.

◆ TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo.

◆ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Khi sử dụng corticosteroid tại chỗ cho động vật mang thai có thể gây bất thường trong quá trình phát triển thai. Sự liên quan giữa kết quả thực nghiệm trên động vật và thực tế trên người chưa được xác lập, tuy nhiên không được sử dụng steroid tại chỗ một cách rộng rãi khi mang thai, nghĩa là với một lượng lớn hoặc trong thời gian dài.

◆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.

◆ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Rối loạn hệ miễn dịch

Rất hiếm: Quá mẫn

Có thể xuất hiện các phản ứng quá mẫn tại chỗ bôi thuốc như ban đỏ, phát ban, ngứa, mề đay, bóng da, viêm da dị ứng tiếp xúc và có thể giống các biểu hiện của bệnh khi điều trị.

Nên ngừng thuốc ngay khi có dấu hiệu của hiện tượng quá mẫn.

Rối loạn nội tiết

Rất hiếm: Ức chế thượng thận

Khi dùng NUVATS trên diện tích da rộng, một vài bệnh nhân có thể hấp thu lượng corticoid đủ để gây ức chế tuyến thượng thận thoáng qua, mặc dù NUVATS có mức độ hấp thu toàn thân thấp.

Rối loạn về da và mô dưới da

Rất hiếm: Teo da, thay đổi sắc tố da, rậm lông (hội chứng Ambras).

Có thể xảy ra teo da cục bộ ở vùng da ẩm do tăng hấp thu clobetason butyrat, nhưng chỉ sau đợt dùng kéo dài.

Các rối loạn tổng quát và tại vị trí thoa thuốc

Rất hiếm: Làm các triệu chứng bệnh nặng thêm.

** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

◆ QUÁ LIỀU

Quá liều cấp tính rất hiếm khi xảy ra; tuy nhiên, trong trường hợp quá liều mãn tính hoặc sử dụng sai, các biểu hiện cường vỏ thượng thận có thể xuất hiện và khi đó phải ngưng corticoid tại chỗ.

◆ BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, nơi khô mát, ở nhiệt độ dưới 30°C.

◆ HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

◆ ĐÓNG GÓI: Hộp chứa 1 tuýp 5 g kem Hộp chứa 1 tuýp 10 g kem

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
 Số 25, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore,
 Thuận An, Bình Dương.