

VIÊN XÔNG  
EUCA-OPC®

<https://vnras.com/drug>  
GMP-WHO

*Để xa tầm tay trẻ em*  
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*  
*Thuốc dùng ngoài, không được uống*

**CÔNG THỨC:** Cho 1 viên

- Thành phần hoạt chất:

Menthol.....	24 mg
Eucalyptol.....	24 mg
Camphor.....	24 mg

- Thành phần tá dược:

Dầu đậu nành, gelatin, glycerin, nipasol M, màu xanh đồng chlorophyl 15%, nước tinh khiết.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm.

Mô tả sản phẩm: Viên nang mềm, hình bầu dục, màu xanh. Nang khô rời, không dính với nhau. Bên trong chứa dịch thuốc dạng dầu màu xanh, có mùi thơm đặc trưng.

**CHỈ ĐỊNH:** Dùng xông khi cảm mạo, cảm cúm, sát trùng mũi họng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Xông trị cảm mạo, cảm cúm: mỗi lần xông dùng 2 viên, ngày xông 1 – 2 lần. Cho 2 viên vào nồi chứa khoảng 2 lít nước vừa sôi, trùm chăn kín, xông trong 10 – 15 phút.

Xông sát trùng mũi họng: mỗi lần xông dùng 1 viên, ngày xông 1 – 2 lần. Cho 1 viên vào ly nước chứa khoảng 300 ml nước vừa sôi, đậy nắp bằng phễu giấy, hít vào mũi hay họng.

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:**

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Thận trọng khi sử dụng.

**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không ảnh hưởng.

**TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ:**

a) Tương tác của thuốc:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

b) Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Khi nuốt phải có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau thượng vị, đau đầu, chóng mặt, nóng rát vùng hầu họng, mê sảng, rung giật cơ, co giật dạng động kinh, trầm cảm, hôn mê, khó thở, bí tiêu. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Xử trí quá liều khi nuốt phải:

Rửa và hút dạ dày khi bệnh nhân nuốt phải trong vòng 1 giờ. Cho uống than hoạt hoặc thuốc nhuận tràng dạng muối như natri sulfat, 30 gam trong 250 ml nước hoặc dung dịch natri phosphat loãng.

Xử trí co giật bằng thuốc tiêm chống co giật và cần nhập viện để điều trị tiếp theo.

**DƯỢC LỰC HỌC:** Viên xông Euca-OPC gồm các thành phần: menthol, eucalyptol và camphor có tác dụng sát khuẩn, long đàm, làm ra mồ hôi, chữa cảm mạo, cảm cúm.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 2 vi × 10 viên. Hộp 10 vi × 10 viên.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH

Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com