

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

UPTIV
(Viên nén đặt âm đạo chứa Nystatin, Di-iodohydroxyquin,
Benzalkonium chlorid)

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén đặt âm đạo có chứa:
Hoạt chất: Nystatin 100.000 IU, Di-iodohydroxyquin 100mg, Benzalkonium chlorid 7mg
Tá dược: Lactose, tinh bột, talc, magnesium stearat.

DƯỢC LỰC HỌC

Nystatin là kháng sinh kháng nấm, chủ yếu gây tác dụng tại chỗ, dùng để điều trị nhiễm nấm candida ở âm hộ, âm đạo.
Di-iodohydroxyquin có tác dụng điều trị viêm âm đạo do *Trichomonas* hoặc *Monilia*, viêm âm đạo không đặc hiệu hoặc hỗn hợp.
Benzalkonium chlorid là thuốc sát trùng.
- *in vitro*, thuốc có tác động trên một số tác nhân gây các bệnh truyền qua đường sinh dục như : Gonocoque, Chlamydiae, Herpes virus type 2, VIH, *Trichomonas vaginalis*, *Staphylococcus aureus*. Ngược lại, thuốc không có tác động trên Mycoplasma và tác động yếu trên *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans*, *Haemophilus ducreyi* và *Treponema pallidum* ;
- *in vivo*, thuốc có tác động ngăn ngừa một số bệnh truyền qua đường sinh dục mặc dù bằng chứng về tác dụng này chưa được tổng kết một cách đầy đủ.
Benzalkonium chlorid không làm thay đổi các vi khuẩn hoại sinh : trực khuẩn Doderlein không bị ảnh hưởng bởi tác động của thuốc.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm nấm candida ở âm hộ, âm đạo, viêm âm đạo do *Trichomonas* hoặc *Monilia*, viêm âm đạo không đặc hiệu hoặc hỗn hợp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Dùng 1-2 viên/ngày, điều trị trong 20 ngày.
Nên dùng thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhúng viên thuốc vào nước rồi đặt sâu vào âm đạo. Tốt nhất nên đặt thuốc ở tư thế nằm ngửa, đầu gối hơi gập. Không nên điều trị trong khi đang có kinh nguyệt, việc điều trị nên hoàn tất trước khi có kinh nguyệt. Viên đặt âm đạo Uptiv không có mùi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC

Cần đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Vệ sinh bộ phận sinh dục thường xuyên là rất cần thiết vì tăng cường vệ sinh sẽ giảm mức độ viêm nhiễm của bộ phận sinh dục. Nên mặc quần lót rộng rãi không quá chặt, nên thay thường xuyên.
- Điều trị cho cả vợ và chồng (vì đây là một bệnh lây truyền từ vợ sang chồng và ngược lại)
- Trong thời gian đang điều trị không được giao hợp để bệnh khỏi truyền từ vợ sang chồng hoặc ngược lại.
- Nếu có phản ứng quá mẫn xảy ra, nên ngừng thuốc ngay và có biện pháp xử lý thích hợp.
- Không được chỉ định dùng cho nhiễm nấm toàn thân vì thuốc hấp thu rất kém qua đường tiêu hóa.
Khi dùng liều cao và kéo dài, Di-iodohydroxyquin có thể gây những phản ứng có hại trên hệ thần kinh trung ương. Thuốc dễ gây phản ứng có hại ở trẻ em hơn ở người lớn.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Có thể làm giảm hiệu quả bao cao su tránh thai.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Nên thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú và chỉ dùng trong trường hợp thật cần thiết.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có dữ liệu.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Có thể bị rối loạn tiêu hóa nhẹ: buồn nôn, tiêu chảy (thường hết sau vài ngày), chán ăn, viêm dạ dày, khó chịu vùng bụng, đau đầu, ban đỏ, ngứa...
Ghi chú: XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ý GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Chưa có dữ liệu

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Nhà sản xuất

HẠN DÙNG

4 năm kể từ ngày sản xuất
KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ THỜI HẠN GHI TRÊN NHÃN

BẢO QUẢN

Giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.
GIỮ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM

TRÌNH BÀY

Hộp 2 vi x 5 viên nén đặt âm đạo
Hộp 4 vi x 5 viên nén đặt âm đạo
Hộp 20 vi x 5 viên nén đặt âm đạo

NHÀ SẢN XUẤT

T. MAN PHARMA COMPANY LIMITED
69 Soi Bangkhunthian 14, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150, Thái Lan