

THUỐC TRĨ NHẤT NHẤT

Để xa tâm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần (cho 1 viên nén bao phim): 500 mg cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương: Đẳng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*) 700mg, Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) 700mg, Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 400mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 400mg, Thăng ma (*Rhizoma Cimicifugae*) 400mg, Sài hồ (*Radix Bupleuri chinensis*) 400mg, Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 400mg, Cam thảo (*Radix et Rhizoma Glycyrrhizae*) 200mg, Sen (hạt) (*Semen Nelumbinis nuciferae*) 400mg, Ý dĩ (*Semen Coicis*) 400mg. Tá dược: Microcrystalline cellulose, Calcium carbonat, Magnesium stearate, Sodium Starch Glycolate, Silicon dioxide, Iron Oxide Brown, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methyl cellulose 6cps, PEG 6000, Talc vừa đủ một viên.

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Chỉ định: Thuốc có tác dụng giảm đau rất ở vùng hậu môn, làm bền vững thành mạch, chống chảy máu, cầm máu, co các búi trĩ, ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát. Dùng để điều trị các trường hợp trĩ cấp tính có các biểu hiện như: chảy máu khi đại tiện, đau rát, sưng ở vùng hậu môn, búi trĩ sa ra ngoài...; Trĩ nội độ 1, 2, 3; trĩ ngoại. Dự phòng bệnh trĩ tái phát.

Liều dùng, cách dùng: Uống với nước ấm trước bữa ăn.

- Đối với trường hợp trĩ cấp tính:

+Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.

+Trẻ em từ 10-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.

- Dự phòng bệnh trĩ tái phát: Ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên.

- Để đạt hiệu quả tốt nên dùng mỗi tháng một đợt từ 10-15 ngày. Có thể dùng liên tục từ 30-45 ngày tùy theo tình trạng bệnh và sức khỏe của mỗi bệnh nhân.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người bị tăng huyết áp.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Người huyết áp cao, trẻ em dưới 10 tuổi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Không ăn thức ăn cay, nóng, các chất kích thích.

- Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

- Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Khi dùng thuốc quá liều thì các lần dùng tiếp theo sử dụng đúng liều theo chỉ dẫn. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Đóng gói: Hộp 2, 3, 10 vỉ x 10 viên; lọ 30, 60, 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689 - Fax: 0272.3817.337

**Điện thoại 1800.6689
(trong giờ hành chính)**