

128494

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để thuốc xa tầm tay trẻ em

CUFO LOZENGES (HONEY LEMON)

Thành phần: mỗi viên ngậm có chứa:

2,4-Dichlorobenzyl Alcohol.....1.2 mg

Amylmetacresol BP.....0.6 mg

Tá dược: Sucrose, Liquid Glucose, Mentha Oil, Essence lemon oil, Honey flavour, Colour sunset yellow FCF, Caramel, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Viên ngậm hình tròn lõm hai mặt, màu vàng nâu, có vị ngọt với hương chanh

Chỉ định:

Hỗ trợ điều trị triệu chứng trong nhiễm khuẩn miệng và họng

Liều dùng và cách dùng:

Liều dùng

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: Thuốc dùng bằng đường miệng

Ngậm 1 viên / lần, mỗi lần dùng cách nhau 2- 3 giờ, sử dụng tối đa 12 viên trong 24 giờ

Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi

Chống chỉ định:

Chống chỉ định với những bệnh nhân dị ứng với bất kì thành phần nào của thuốc

Cảnh báo và thận trọng:

Chưa có báo cáo nào được ghi nhận về những triệu chứng lạ xuất hiện khi dùng thuốc

Tá dược sucrose: bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về việc không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose-galactose hay thiếu hụt sucrose-isomaltase không nên dùng thuốc này

Tương tác thuốc:

Không có tương tác nào đáng kể được ghi nhận

Tác dụng không mong muốn:

Danh mục tác dụng không mong muốn sau đây liên quan đến những người đã dùng thuốc không kê đơn trong một thời gian ngắn

Tác dụng không mong muốn liên quan đến 2,4-dichlorobenzyl alcohol và amylmetacresol được đưa ra dưới đây, được xếp loại theo tần suất và hệ cơ quan. Tần suất được xác định: phổ biến ($\geq 1 / 10$); Thường gặp ($\geq 1 / 100$ và $< 1/10$); Ít gặp ($\geq 1 / 1000$ và $< 1/100$); Hiếm ($\geq 1 / 10.000$ và $< 1/1000$); Rất hiếm ($< 1 / 10.000$); Không được biết (không thể ước tính được từ dữ liệu có sẵn). Trong mỗi nhóm tần suất, các tác dụng không mong muốn được trình bày theo thứ tự giảm mức độ nghiêm trọng.

Hệ cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn hệ miễn dịch	Chưa rõ	Quá mẫn
Rối loạn hệ tiêu hóa	Chưa rõ	Khó chịu trong miệng, đau lưỡi

Cần báo ngay cho bác sĩ, dược sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có báo cáo an toàn được thiết lập, vì vậy khuyến cáo không nên sử dụng thuốc này cho phụ nữ mang thai và cho con bú

Khi lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng

Quá liều và xử trí:

Dùng quá liều có thể gây khó chịu về đường tiêu hóa. Trong trường hợp này tiến hành điều trị triệu chứng.

Dược lực học:

Nhóm dược lý: thuốc tác dụng trên đường hô hấp

2,4-dichlorobenzyl alcohol và amylmetacresol là chất khử trùng và có tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng vi rút như đã được chứng minh trong ống nghiệm. Khi 2 hoạt chất được kết hợp, tác dụng kháng khuẩn hiệp đồng được ghi nhận

Nghiên cứu đã chứng minh tác dụng diệt khuẩn trong trường hợp đau họng gây ra bởi các vi khuẩn *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenza* và *Moraxella catarrhalis*, với khoảng thời gian tiếp xúc 1 phút, vi khuẩn trong miệng cũng đã được ghi nhận là giảm tổng thể về số lượng.

Thuốc cũng được ghi nhận là có khả năng kháng lại các vi rút như vi rút cúm A, vi rút parainfluenza gây khó thở ở trẻ em, vi rút hợp bào hô hấp, vi rút CMV, corona vi rút

Dược động học:

Không áp dụng

Bảo quản:

Nơi khô mát tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm

Tiêu chuẩn:

Nhà sản xuất

Hạn dùng

3 năm kể từ ngày sản xuất



Sản xuất bởi:

UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES

(A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd)

Survey no. 101/2 & 102/1, Daman Industrial Estate,

Airport Road, Village-Kadaiya,

Daman-396 210, Ấn Độ.