

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx-Thuốc kê đơn

GMP-WHO

**Viên nén
bao đường**

DIỆP HẠ CHÂU

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao đường chứa

- Cao khô diệp hạ châu đẳng.....60 mg

Tương ứng với 250 mg diệp hạ châu đẳng

(*Herba Phyllanthi amari*)

- Tá dược (lactose monohydrat, tinh bột sắn, povidon K30, Aerosil, magnesi stearat, đường RE, đường RS, titan dioxid, gôm arabic, canxi carbonat, màu ponceau lake, parafin, dầu parafin) vừa đủ.....1 viên

DƯỢC LỰC HỌC

- Cao diệp hạ châu có tác dụng bảo vệ tế bào gan chuột cống trắng chống lại tính độc hại tế bào gây bởi carbon tetrachlorid và galactosamin. Ngoài ra, cao diệp hạ châu còn có tác dụng ức chế DNA polymerase của siêu vi viêm gan B.

- Trong một nghiên cứu lâm sàng sơ bộ với một dạng bào chế từ toàn bộ cây diệp hạ châu trên 37 người mang siêu vi viêm gan B, với liều 200 mg trong 30 ngày, có 22/37 bệnh nhân (59 %) đã mất kháng nguyên bề mặt HbsAg của siêu vi B ở ngày 15 - 20 sau khi kết thúc điều trị (ở nhóm đối chứng dùng placebo chỉ có 4 %).

- Diệp hạ châu có tác dụng kháng khuẩn đối với tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn *Coli*, *Shigella dysenteriae*...

- Theo đông y, diệp hạ châu có tác dụng tiêu độc, sát trùng, tiêu viêm, tán ứ, thông huyết mạch, lợi tiểu.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Không có thông tin.

CHỈ ĐỊNH: Được chỉ định trong các trường hợp sau

- Tăng cường chức năng gan, phục hồi tế bào gan.

- Điều trị hỗ trợ viêm gan, đau yết hầu, ung nhọt, đinh râu, lở ngứa.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

Theo sự chỉ định của Bác sĩ, hoặc liều trung bình là

- Người lớn: Mỗi lần 3 viên, ngày 3 lần.

- Trẻ em: Mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.

Thời gian dùng thuốc: 1 đến 3 tháng, tùy tình trạng bệnh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người đái tháo đường, phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.

**Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

SỬ DỤNG Ở NGƯỜI ĐANG LÁI XE HAY VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không được sử dụng ở người đang lái xe hay vận hành máy móc.

KHUYẾN CÁO

- Không nên dùng thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghi ngờ về chất lượng thuốc.
- Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Hộp 1 lọ x 90 viên, hộp 9 vỉ x 10 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.3760130 Fax: 0236.3760127

Email: Info@danapha.com

Điện thoại tư vấn: 0236.3760131

Và được phân phối tại các chi nhánh trên toàn quốc