

OsteomedTM

TABLETS

(CALCI, MAGNE, KẼM VÀ VITAMIN D3)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa

Calcium carbonate B.P	
Tương đương với Calcium nguyên tố	400 mg
Magnesium Hydroxide B.P	
Tương đương với Magnesium nguyên tố	150 mg
Zinc sulphate monohydrate U.S.P	
Tương đương với Kẽm nguyên tố	5 mg
Vitamin D3 (dạng ổn định)	100 I.U

Tá dược: Microcrystalline Cellulose BP, Tinh bột ngô B.P, Dibasic calcium Phosphate BP, Sodium Starch Glycollate BP, Polyvinylpyrrolidone BP, Talc tinh khiết BP, Magnesium Stearate BP, Opadry White

CHỈ ĐỊNH:

Osteomed là một dạng thuốc dùng bổ sung Calci, Magne, kẽm và vitamin D3 trong chế độ ăn, ở những tình trạng thiếu hụt khoáng chất.

Đặc biệt khuyến cáo trong các tình trạng thiếu hụt Calci, Magne, kẽm và Vitamin D3 sau:

- Trong thời kỳ mãn kinh và sau mãn kinh.
- Trẻ đang lớn.
- Phụ nữ mang thai và cho con bú.
- Người lớn tuổi.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, ĐƯỜNG DÙNG:

2 viên mỗi ngày (hoặc 1 viên x 2 lần mỗi ngày), dùng uống với thức ăn hoặc theo chỉ định của Bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Osteomed chống chỉ định trong những trường hợp sau:

- Tăng calci huyết và chứng tăng năng tuyến cận giáp.
- Tăng calci niệu và bệnh sỏi thận
- Suy chức năng thận nặng
- Dùng cùng với digoxin.
- Và bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Thận trọng với bệnh nhân sarcoid, bệnh tim và đang điều trị với glycoside.

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân có tiền sử bệnh sỏi thận, bệnh thận hoặc suy thận, bệnh gan. Cần kiểm tra hàm lượng Calci trong máu và nước tiểu.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Osteomed được dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Corticosteroid: khi dùng chung Corticosteroid sẽ làm giảm sự hấp thu calci trong Osteomed.

Levothyroxine, Tetracycline/fluorid, Biphosphonat: sự hấp thu của những thuốc này giảm nếu dùng chung với Osteomed.

Digoxin: Calci trong Osteomed làm tăng hiệu quả của Digoxin

Thuốc lợi tiểu Thiazid: làm tăng quá mức lượng Calci trong cơ thể nếu dùng chung với Osteomed

Verapamil và thuốc chẹn kênh calci khác: Osteomed liều cao sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc này.

TÁC DỤNG PHỤ:

Rất hiếm: có thể gây rối loạn tiêu hoá nhẹ (táo bón, đầy hơi, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy)

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Những thành phần dùng trong công thức Osteomed thì được dung nạp tốt.

Trong trường hợp quá liều có thể dẫn tới tăng calci huyết, tăng vitamin D và tăng calci niệu. Trong trường hợp quá liều, ngưng dùng thuốc ngay và tham khảo ý kiến Bác sỹ.

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sỹ"

"Để xa tầm tay trẻ em"

TRÌNH BÀY: Viên Osteomed đóng vỉ 15 viên (mỗi hộp carton chứa 30 viên - 2x15 viên).

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN

Bảo quản dưới 30°C, nơi khô thoáng. Tránh ánh sáng



Sản xuất tại Ấn Độ bởi : MEYER ORGANICS PVT. LTD.

10 D, 2nd Phase, Peenya Ind. Area, Bangalore – 560 058.

Văn phòng : A-177, Wagle Estate, Thane – 400 604. (Mumbai) ẤN ĐỘ.

Hợp tác kỹ thuật với : Omega-Meyer Ltd. Jersey, British Isles