

KC THUỐC KẾ HOẠCH

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

PHILHYAL-SAN

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ (5mL) chứa

Hoạt chất: Natri hyaluronat..... 5mg

Tá dược: Benzalkonium clorid, dinatri edetat hydrat, acid aminocaproic, natri clorid, kali clorid, acid hydrocloric loãng, natri hydroxyd, nước vô khuẩn.

DẠNG BẢO CHẾ: Dung dịch nhỏ mắt

DƯỢC LỰC HỌC

Do hoạt chất của PHILHYAL-SAN có cấu trúc giống với natri hyaluronat tự nhiên và trọng lượng phân tử trên 4000 KDa nên thuốc có tính tương hợp sinh học và độ đàn hồi, độ nhớt cao. Hoạt chất của PHILHYAL-SAN được tạo ra từ quá trình ủ vi sinh học hiện đại nên chế phẩm chứa hàm lượng protein thấp và hoàn toàn không chứa các chất gây viêm.

Nhờ có độ đàn hồi và độ nhớt cao, thuốc có hiệu quả trong việc duy trì và bảo vệ tế bào biểu mô giác mạc.

Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy natri hyaluronat là một hợp chất sinh học có tác dụng đẩy nhanh sự lành vết thương của các tế bào biểu mô giác mạc và có đặc tính giữ nước. Tác dụng lâm sàng này đã được sử dụng trong điều trị tổn thương biểu mô giác-kết mạc có liên quan đến hội chứng khô mắt hoặc các rối loạn khác.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Natri hyaluronat được phân bố rộng khắp trong mô cơ thể và trong dịch nội bào, kể cả dịch thủy tinh thể.

CHỈ ĐỊNH

Rối loạn biểu mô giác, kết mạc do các nguyên nhân sau:

- Do nội tại như bệnh Sjogren's, hội chứng Stevens-Johnson và hội chứng khô mắt,....
- Do tác động từ bên ngoài vào mắt như do phẫu thuật, do thuốc, chấn thương, do dùng kính sát trùng,....

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Thuốc này chỉ dùng để nhỏ mắt.

Thông thường, mỗi lần nhỏ 1 giọt, ngày nhỏ 5-6 lần.

Liều dùng có thể được điều chỉnh tùy theo triệu chứng của bệnh nhân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc cho bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Khi dùng thuốc, phải hướng dẫn bệnh nhân không được để đầu của lọ thuốc tiếp xúc trực tiếp vào mắt, nhằm tránh làm nhiễm bẩn thuốc.

Không nên dùng thuốc khi đang đeo kính sát trùng.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này với các thuốc khác.



SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Ước có những nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng thuốc ở phụ nữ đang mang thai hoặc đang

Chỉ sử dụng thuốc này cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị với nguy cơ có thể xảy ra.

TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không tác động đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Quá mẫn: Viêm bờ mi, viêm đa mi mắt.

Ngứa mắt, kích ứng ở mắt, tổn thương giác mạc ví dụ như viêm giác mạc lan tỏa nông.

*** Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

QUẢ LIỀU

Chưa có trường hợp quả liều khi dùng thuốc nhỏ mắt PHILHYAL-SAN được báo cáo.

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Dùng thuốc trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 5mL/10/hộp.

Sản xuất bởi:

DAEWOO PHARM. CO., LTD.

153, Dadae-ro, Saha-gu, Busan, Hàn Quốc



**TUO. CUC TRUONG
P. TRUONG PHONG**