

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH



DẦU GIÓ TRẮNG HIỆU CÂY BÚA

AXE BRAND UNIVERSAL OIL

Khuyến cáo:

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

1. Thành phần, hàm lượng của thuốc.

Mỗi 100G dịch thuốc chứa:

Dược chất - Menthol Crystals (Tinh dầu Bạc Hà):	20 g
- Eucalyptus Oil (Tinh dầu Khuynh Diệp):	15 g
- Methyl salicylate:	15 g
- Camphor (Long Nảo):	5 g

Tá Dược: Essential oil (Tinh dầu) 12 g, Liquid paraffin (dung dịch paraffin) vừa đủ 100g.

2. Mô tả sản phẩm: Dung dịch trong suốt, mùi đặc trưng.

3. Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh trắng, đựng trong hộp giấy có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp chứa 1 chai 5 ml, 10ml, 56ml dung dịch thuốc.

4. Thuốc dùng cho bệnh gì?

- Giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho khan, nhức đầu, sổ mũi, buồn nôn, khó chịu do say tàu xe, đau bụng đầy hơi, đau lưng, nhức mỏi chân tay, các vết sưng ngứa do côn trùng đốt.

5. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

- Trường hợp cảm lạnh, ho khan, nhức đầu, sổ mũi, say tàu xe, buồn nôn, đau bụng, đầy hơi: thoa thuốc hai bên thái dương, cổ, bụng, gan bàn chân và bàn tay cho tới khi thấy ấm người lên. Thoa bôi thuốc trên mũi để hít và ngửi.

- Trường hợp đau lưng, nhức mỏi tay chân, côn trùng đốt: thoa xung quanh chỗ đau nhức. Mỗi ngày 3 đến 4 lần.

- Chỉ xoa ngoài da, không được uống.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú; trẻ em dưới 30 tháng tuổi.

- Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh hay co giật do sốt cao.

- Không dùng cho người dị ứng với Salicylates, Aspirin hay bất cứ hoạt chất nào có trong thuốc

7. Tác dụng không mong muốn

- Làm tăng tiết mồ hôi, giảm thân nhiệt. Có thể gây kích ứng và làm khó chịu nơi thoa thuốc.

8. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

- Đối với bệnh nhân đã dùng warfarin, việc bôi xoa quá nhiều Dầu gió trắng trên da: có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết dưới da do sự hấp thu của Methyl Salicylate qua da

9. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

- Nếu quên một liều, bỏ qua liều đã quên và tiếp tục liều kế tiếp như hướng dẫn. Không nên dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

10. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

- Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng, để nơi khô ráo thoáng mát.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

- Nếu có dấu hiệu bất thường như buồn nôn, nôn mửa, trạng thái lơ đãng...phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

- Khi uống nhầm Camphor và menthol cũng gây ra các triệu chứng ngộ độc.

12. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

- Sản phẩm không được phân liều cụ thể, tuy nhiên cần bôi xoa với lượng vừa phải, không được bôi xoa trên diện rộng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như buồn nôn, nôn mửa, trạng thái lơ đãng...phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

- Khi uống nhầm Camphor và Menthol cũng gây ra các triệu chứng ngộ độc cần thông báo cho Bác sỹ và đến ngay cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn và điều trị kịp thời.

Xử trí ngộ độc khi uống nhầm Dầu gió Trắng hiệu cây Búa:

a- Xử trí ngộ độc Salicylate:

- Hút dịch hoặc rửa dạ dày kết hợp với dùng than hoạt để loại bỏ độc chất.

- Kiểm hóa nước tiểu bằng truyền tĩnh mạch Natri Bicacbonat, truyền dung dịch bổ sung Kali Clorua khi cần.

- Thẩm phân hoặc truyền, thay máu khi cần thiết.

b-Xử trí ngộ độc Camphor, Menthol, Eucalyptus oil:

- Rửa dạ dày với dầu Paraffin rồi cho thuốc tẩy ruột có muối.

- Điều trị triệu chứng: dùng Diazepam khi có co giật; dùng Atropin để làm giảm tiết dịch phế quản; hô hấp hỗ trợ trong trường hợp suy hô hấp.

13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

- Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt, miệng và niêm mạc.

- Không bôi thuốc lên phần da bị tổn thương hay các vết thương hở

- Cần trọng: không để trẻ sơ sinh hít thuốc vào mũi.

Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và sử dụng máy móc

- Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

14. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ?

- Nên thông báo cho bác sỹ nếu bạn mắc cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đang sử dụng các thuốc khác, đang mang thai, cho con bú, hoặc gặp bất kỳ phản ứng nào khác của thuốc.

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

15. Hạn dùng của thuốc

5 năm kể từ ngày sản xuất.

16. Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm về thuốc

Tên: Công ty Dược phẩm TNHH Leung Kai Fook Việt Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 51, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

17- Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung Hướng dẫn sử dụng thuốc