

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
HỎI THẦY THUỐC ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC
ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

Rx DEBBY
NIFUROXAZID

Thuốc điều trị tiêu chảy cấp và mạn tính

Thành phần

Mỗi 5 ml Debby chứa:

Hoạt chất:

Nifuroxazid 218,00 mg

Tá dược: Gôm Xanthan, Glycerin, Sorbitol, Dầu Polyoxyl 40 Hydrogenat Castor, Propylen Glycol, Methylparaben, Propylparaben, Natri Saccharin, Magnesi Nhôm Silicat, Acid Citric, Hương dứa, Natri Citrate, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Hỗn dịch

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa 30 ml & 60 ml hỗn dịch.

Dược động học: Nifuroxazid không hấp thu ở niêm mạc dạ dày. Vì thế hoạt tính được định vị tại chỗ. Nó hấp thu kém trong hệ thống tiêu hoá.

Dược lực học: Nifuroxazid là kháng sinh đường ruột có hoạt phổ rộng, hấp thu yếu trong dạ dày, ruột, Nifuroxazid được dùng trong điều trị viêm ruột kết và tiêu chảy.

Chỉ định

DEBBY được chỉ định điều trị tiêu chảy cấp và mạn, bệnh lý trực khuẩn và chứng viêm ruột kết.

Trong quá trình điều trị tiêu chảy, việc bù nước & điện giải luôn cần thiết.

Liều lượng & cách dùng

Trẻ dưới 6 tháng tuổi: 1 muỗng cà phê (5 ml)/lần, 2 lần trong ngày.

Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên: 1 muỗng cà phê (5 ml)/lần, 3 lần trong ngày.

Thời gian điều trị không nên quá 7 ngày.

Thuốc dùng đường uống. Lắc chai kỹ trước khi sử dụng.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ sơ sinh từ 0 - 1 tháng tuổi.

Thận trọng

Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sỹ ngay trong những trường hợp sau:

- Tiêu chảy nhiều hơn 6 lần mỗi ngày hoặc kéo dài hơn 24 giờ hoặc đi kèm với sự sụt cân. Khi ấy bác sỹ sẽ xác định nhu cầu bù nước, có thể bằng đường uống.
- Có sốt hoặc nôn.
- Có máu hoặc nhầy trong phân.

Tương tác thuốc: Không có thông tin có ý nghĩa.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Không nên dùng thuốc trong thời gian có thai.
- Có thể tiếp tục cho con bú nếu chỉ dùng thuốc trong thời gian ngắn.
- Như một quy tắc chung, khi đang có thai hoặc đang cho con bú, bạn nên hỏi bác sỹ trước khi dùng bất kỳ các loại thuốc nào.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Tác dụng không mong muốn:

DEBBY được dung nạp tốt. Thuốc hầu như không gây tác dụng phụ. Có khả năng xảy ra những phản ứng dị ứng như nổi mẩn trên da, mề đay, phù Quinke (sưng nề đột ngột một phần cơ thể, thường là mặt, lưỡi, cổ), hoặc sốc phản vệ (có thể sốc dị ứng toàn thân).

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng quá liều: Không có thông tin có ý nghĩa.

Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô mát không quá 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Nhà sản xuất:



Công ty TNHH Thai Nakorn Patana (Việt Nam)

636 Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên