

VITAMIN B2

2 mg

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vỉ, 60 vỉ x 30 viên, hộp 1 lọ x 100 viên.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

Mô tả: Viên nén màu vàng.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Thành phần hoạt chất: Vitamin B₂ (Riboflavin).....2 mg

Thành phần tá dược: Lactosse, Tinh bột, Talc, Magnesi stearat.....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và điều trị khi thiếu vitamin B₂. Sự thiếu hụt vitamin B₂ có thể dẫn đến sự xuất hiện của hội chứng Ariboflavinosis bao gồm các triệu chứng như nứt môi, viêm nứt góc miệng, viêm loét lưỡi, viêm loét giác mạc, xơ vữa mạch trên giác mạc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- **Liều dự phòng:** uống 1 viên (2 mg)/lần/ngày.

- **Liều điều trị:**

+ Trẻ em: uống 1 - 5 viên (2 - 10 mg)/ngày, chia thành những liều nhỏ.

+ Người lớn: uống 3 - 15 viên (6 - 30 mg)/ngày, chia thành những liều nhỏ.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ thiếu hụt vitamin B₂.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Sản phẩm chứa lactose, nên liên hệ bác sỹ trước khi dùng thuốc nếu mắc chứng không dung nạp đường.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không gây ảnh hưởng gì khi người mẹ dùng theo nhu cầu hàng ngày hoặc bổ sung liều thấp các vitamin.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Đã gặp một số ca "thiếu vitamin B₂" ở người đã dùng clopromazin, imipramin, amitryptilin và adriamycin.

- Rượu có thể gây cản trở hấp thu vitamin B₂ ở ruột.

- Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavin ở dạ dày, ruột.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Không thấy có tác dụng không mong muốn khi sử dụng vitamin B₂.

- Dùng liều cao vitamin B₂ thì nước tiểu chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch đối với một số xét nghiệm nước tiểu trong phòng thí nghiệm.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Dùng liều cao vitamin B₂ thì nước tiểu chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch đối với một số xét nghiệm nước tiểu trong phòng thí nghiệm.

- Vitamin B₂ là một vitamin tan trong nước, đào thải qua thận. Khi lượng đưa vào vượt quá sự cần thiết của cơ thể sẽ thải ra dưới dạng không đổi trong nước tiểu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Traphaco

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội / Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

HY18VNT103Th