




THUỐC HỖ TRỢ CẮT CƠN CAI NGHIỆN MA TÚY

BÔNG SEN

ĐẠT “NGÔI SAO THUỐC VIỆT 2014”



500 ml

DẠNG BẢO CHẾ: CAO LỎNG

SẢN XUẤT TẠI:
**CÔNG TY TNHH KINH DOANH XNK TỔNG HỢP & DỊCH VỤ
FATACO BENTRE**

Nhà máy Đông dược “Bông Sen” đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

ĐC: Số 79, Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre

Tel: 0275.3813779 Fax: 0275.3815079

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
40 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11, Tp. HCM

Tel: 028.38580442

Website: www.fatacobentre.com; Email: fatacobentre.79@gmail.com

Website: bán hàng trực tuyến: www.thuoccainghiensmatuymbongsen.vn

Số đăng ký lưu hành: TCT-00205-24 ngày 13/06/2024 Bộ y tế

R_x Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC HỖ TRỢ CẮT CƠN CAI NGHIỆN MA TÚY

BÔNG SEN

“Để xa tầm tay trẻ em, Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN: cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Chai 500ml cao lỏng hỗn hợp dược liệu tương đương với:

Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 30,0 g
Ô mai (*Fructus Mume*) 30,0 g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 22,5 g
Nhục thung dung (*Herba Cistanches*) 18,75 g
Nhân sâm (*Radix et Rhizoma Ginseng*) 15,0 g
Sinh khương (*Rhizoma Zingiberis recens*) 7,5 g
Hải diêm (*Natrii chloridum*) 3,75 g
Mật ong (*Mel*) 75,0 g
Tá dược: Nước tinh khiết (*Aqua purificata*) ...vừa đủ 500ml

Dạng bào chế: Cao lỏng

Tác dụng: Hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- Hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy, dùng cho người mới nghiện hoặc nghiện lâu năm.
- Hỗ trợ cắt cơn cai nghiện một cách êm dịu, không vật vã, dễ uống.
- Hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy ở các trung tâm cai nghiện, tại gia đình và cộng đồng.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG:

Thuốc uống trước khi ăn 10 phút. Lắc đều trước khi dùng thuốc.

a) Đối với người nghiện: Thời gian điều trị từ 7-10 ngày.

- 4 ngày đầu uống 60ml/lần x 4 lần/ngày. Mỗi lần uống cách nhau 2-3 giờ.

- Những ngày tiếp theo: uống 60ml/lần x 2-3 lần/ngày

b) Đối với người nghiện nặng và lâu năm: Thời gian điều trị từ 7-10 ngày

- 4 ngày đầu: uống 80ml/lần x 4 lần/ngày, mỗi lần uống cách nhau từ 2-3 giờ.

- Những ngày tiếp theo uống 80ml/lần x 2-3 lần/ngày

* 15ml thuốc tương đương với 1 thìa canh.

Chú ý:

* Nếu thời gian lên cơn thêm thuốc xuất hiện cố định, hàng ngày có thể uống thuốc trước thời gian lên cơn để chặn

<https://vnras.com/drug/>

cơn.

* Bệnh nhân bị tiêu chảy nhiều có thể dùng thêm ORESOL để bù nước và điện giải cho cơ thể.

* Trong thời gian uống thuốc Bông Sen, bệnh nhân không được sử dụng tất cả các chất ma túy mới cai nghiện thành công.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt
- Không dùng cho bệnh nhân bị bệnh tim, phổi cấp tính, sức khỏe quá yếu.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Không được truyền Natriclorid 0,9% trong thời gian dùng thuốc.
- Không uống rượu, bia khi dùng thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ

Tương tác, tương kỵ của thuốc: Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc.

Do chưa có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Không dùng cho người đang vận hành máy móc thiết bị.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng như nóng trong người, bứt rứt, khó chịu. Nên đến gặp bác sĩ thông báo những tác dụng nói trên khi dùng thuốc quá liều và xin tư vấn xử trí.

Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 500ml và Tờ hướng dẫn sử dụng.