

LIVERBIL[®]

GMP-WHO

CÔNG THỨC: Cho 1 viên.

Cao đặc Actisô 40 mg tương ứng với:

Actisô (*Folium Cynarae scolymi*).....400 mg

Cao đặc Bìm bìm biếc 40 mg tương ứng với:

Bìm bìm biếc (*Semen Pharbitidis*).....400 mg

Cao đặc Rau đắng đất - Diệp hạ châu 80 mg tương ứng với:

Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifolii*).....400 mg

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*).....400 mg

Tá dược (lactose, tinh bột ngô, calci carbonat, natri carboxymethyl cellulose, magnesi stearat, vỏ nang cứng).....vừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ:

LIVERBIL[®] là chế phẩm được bào chế từ các dược liệu Actisô, Bìm bìm biếc, Rau đắng đất và Diệp hạ châu có tác dụng: tăng tiết mật, lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan. Trong đó:

Actisô có tác dụng: tăng mật, lợi tiểu, chống độc; giảm cholesterol huyết, bảo vệ gan.

Bìm bìm biếc có tác dụng: nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu sưng, sát trùng.

Rau đắng đất có tác dụng: nhuận gan, lợi tiểu, lợi tiêu hóa và sát trùng.

Diệp hạ châu có tác dụng: lợi tiểu, tiêu độc, sát trùng.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan, suy giảm chức năng gan.

Thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ gan.

Điều trị các triệu chứng: đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, mụn nhọt, mẩn ngứa, mề đay do rối loạn chức năng gan, viêm gan gây ra.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống trước bữa ăn.

Người lớn: uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

Trẻ em: uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho bệnh nhân bị viêm, tắc mật, phụ nữ có thai.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Không dùng cho người tỳ vị hư hàn, đau bụng đi lỏng, hoặc phân nát kéo dài.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH

Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com