

Viên Dưỡng Não OP.CAN[®]

GMP-WHO

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CÔNG THỨC: Cho 1 viên

- Thành phần hoạt chất:

Cao khô lá Bạch quả40 mg

(*Extractum Folium Ginkgo Siccus*)

(Tương đương 9,6 mg flavonoid toàn phần)

- Thành phần tá dược: Prosolv SMCC 90, natri starch glycolat, bột talc, magnesi stearat, chitofilm bột, màu đỏ ponceau 4R lake, màu vàng quinolin lake, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim màu hồng đỏ, hình trụ 2 mặt lồi, nhân bên trong màu trắng ngà đến vàng nhạt, vị hơi đắng.

THÔNG TIN VỀ DƯỢC LÝ:

Điều hòa trên tiêu động mạch, mao mạch, tĩnh mạch (tăng lưu lượng máu).

Tác dụng lưu biến máu (giảm độ nhớt, do đối kháng với thụ thể của PAF).

Tác dụng bảo vệ trên chuyển hóa tế bào.

Cải thiện rối loạn dẫn truyền thần kinh.

Đối kháng với sự sản xuất gốc tự do và peroxid hóa lipid màng tế bào.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiếu năng tuần hoàn não. Û tai, chóng mặt, giảm thính lực. Chân đi khắp khiễng cách hồi.

Một số trường hợp thiếu máu vồng mạc. Hội chứng Raynaud.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần. Uống trong hoặc sau bữa ăn. Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người bệnh rối loạn đông máu. Pha nhồi máu, tim cấp, xuất huyết não. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng cho người đang dùng thuốc chống đông máu.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không được sử dụng.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ:

a) Tương tác của thuốc:

Không được dùng nếu vừa sử dụng thuốc kháng đông máu vì cao lá Bạch quả có thể kéo dài thời gian chảy máu.

Không dùng cùng thuốc chống động kinh, thuốc chống trầm cảm.

b) Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày: rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Có thể kéo dài thời gian chảy máu. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ × 15 viên.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH

Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương