

Tên thuốc :
EAGLE BRAND YELLOW BALM
CAO VÀNG CON O

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Đề xa tâm tay trẻ em”

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

Thành phần của thuốc :

Thành phần cho 1 lọ 10g

Hoạt chất

Menthol..... 1,55 g

Eucalyptus Oil..... 1,95 g

Methyl Salicylate..... 0,80 g

Camphor..... 0,40 g

Peppermint oil..... 1,00 g

Tá dược : Hard paraffin, Yellow colour (Natracol Beta carotene).

Mô tả sản phẩm : Cao xoa màu vàng, mùi đặc trưng

Quy cách đóng gói : Hộp 1lọ 10g, 20g, 40g.

Thuốc dùng cho bệnh gì : Các cơn đau đầu, choáng váng, chóng mặt, đau lưng, đau thắt lưng, thấp khớp, các vết côn trùng đốt, mẩn ngứa và các triệu chứng cảm lạnh.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? Thoa một lượng vừa đủ Cao vàng Con Ó, dùng lòng bàn tay xoa đều, và nhẹ nhàng vào vùng da bị đau. Dùng các đầu ngón tay ấn và xoa bóp theo hình tròn tại vùng da bị đau. Lặp lại cho đến khi cảm nhận được cảm giác ấm và dễ dàng khuynh diệp trong Cao vàng Con Ó làm dịu cơn đau.

Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Không dùng cho vết thương hay vùng da bị trầy xước.
- Không sử dụng cho người bị dị ứng với Menthol, Salicylate hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không sử dụng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Tác dụng không mong muốn : Đỏ da hay dị ứng da có thể xảy ra, đặc biệt ở bệnh nhân da nhạy cảm. Nếu triệu chứng tiếp tục kéo dài hay da bị mẩn ngứa, sưng phồng hay bị phát ban, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn. Nếu bôi thuốc trên diện rộng hay bôi vào vùng da bị tổn thương, thuốc có thể bị hấp thu. Hãy thông báo cho bác sĩ nếu bạn thấy: kêu trong tai, buồn nôn hay nôn.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này? Chưa tìm thấy tài liệu. Thông báo cho bác sĩ các thuốc mà bạn đang sử dụng trong thời gian điều trị. Không được tự ý dùng các thuốc khác hay dùng đồng thời với các thuốc khác nếu không có sự đồng ý của bác sĩ của bạn.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? Bôi thuốc đều đặn lại theo lịch bình thường, không quá 3 đến 4 lần trong ngày.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào? Đóng nắp kín và bảo quản sản phẩm nơi khô mát với nhiệt độ không quá 30°C

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

Quá liều Methyl salicylat : Nhiễm độc salicylate có thể xảy ra sau khi uống hoặc bôi methyl salicylate. Nhiễm độc mãn tính thường xảy ra khi sử dụng lặp lại liều lớn hoặc bôi quá nhiều salicylate.

Các triệu chứng bao gồm: chóng mặt, ù tai, ra mồ hôi, buồn nôn, ói mửa, và rối loạn tâm thần. Các triệu chứng trên có thể được kiểm soát bằng cách giảm liều sử dụng.

Các triệu chứng nhiễm độc nặng hoặc quá liều cấp tính sau ngộ độc bao gồm: tăng thông khí phổi, sốt, ketosis và nhiễm kiềm hô hấp và toan chuyển hóa. Suy nhược hệ thần kinh trung ương có thể dẫn đến hôn mê, trụy tim mạch và suy hô hấp.

Quá liều menthol : Nuốt phải một lượng lớn là nguyên nhân gây ra các triệu chứng . buồn nôn, nôn mửa, đau bụng dữ dội, chóng mặt, mất điều hòa vận động, mê sảng, giật cơ, co giật và cơn động kinh, trầm cảm và hôn mê. Có thể gây suy hô hấp tức thời cho trẻ nhỏ nếu bôi dầu trực tiếp lên mũi.

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo : Ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ càng sớm càng tốt ngay khi các triệu chứng trên xuất hiện.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này : Chỉ bôi ngoài da. Không được uống. Không dùng để băng bó vết thương. Không thoa lên mắt và niêm mạc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú : Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. Hãy thảo luận với bác sĩ của bạn về nguy cơ và lợi ích của việc dùng thuốc trong thời gian có thai và cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Chưa có báo cáo.

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ : Thông báo hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu có cơ địa dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

Hạn dùng của thuốc : 60 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc quá hạn sử dụng được ghi trên bao bì

Nhà Sản xuất : PT EAGLE INDO PHARMA

Jl. Raya Siliwangi Km. 1, Desa Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang Indonesia.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc : 13/9/2017