

AMEPOX Soft capsule
(L-Cystin 500mg)
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Tên thuốc: AMEPOX Soft capsule
Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa
Hoạt chất: L-cystin.....500 mg
Tá dược: dầu đậu nành, sáp ong trắng, lecithin, polysorbat 80, gelatin, glycerin đậm đặc, dung dịch D-sorbitol, ethyl vanillin, titanium oxid, màu vàng số 5, nước tinh khiết.
Dạng bào chế: Viên nang mềm.
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vi x 5 viên.
Dược lực học:
L-Cystin là một amino acid tự nhiên, có tác dụng tăng chuyển hóa protein. L-Cystin ức chế Collagenase-enzym phá hủy chất tạo sẹo, làm hư hại giác mạc. Collagenase được tạo thành ở nơi tổn thương giác mạc gây ra do chấn thương, hóa chất, virus hoặc vi khuẩn.
Trong thành phần L-Cystin có chứa gốc -SH, có tác dụng khử các gốc tự do, là tác nhân đóng vai trò chủ yếu trong nhiều bệnh thoái hóa và lão hóa (như đục thủy tinh thể, đái đường, ung thư, viêm gan, viêm khớp...).

L-cystin là một thành phần cơ bản của các chất nền (18% trong tóc, 14% trong móng) và chiếm một tỷ lệ ít hơn trong da (2 đến 4%). L-cystin tham gia vào quá trình tổng hợp keratin của tóc và móng. Nó thúc đẩy sự tăng sinh của các tế bào mầm ở các vùng tạo chất sừng và có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các chất nền.

L-Cystin có đủ trong hắc tố bào sẽ tác dụng với dopaquinon tạo ra cystinydopa có tác dụng điều chỉnh sự cấu tạo hắc tố ở da, giúp làm điều trị các vết thâm nám do các nguyên nhân khác nhau

Dược động học:
L-cystin hấp thu tích cực từ đường ruột, nồng độ đỉnh huyết tương đạt được từ 1-6 giờ sau khi uống.
L-cystin được phân bố chủ yếu ở gan và có ở bề mặt cơ thể sau 5 giờ.
Thuốc được chuyển hóa qua gan, thải trừ chủ yếu qua mật, 21% liều L-cystin được thải trừ trong vòng 24 giờ sau khi uống.

Chỉ định: *AMEPOX soft capsule được chỉ định trong các trường hợp:*

- Sạm da do tàn nhang, nám da, da rám nắng
- Viêm da do thuốc
- Chàm dị ứng, nổi mề đay, phát ban
- Viêm giác mạc, loét và tổn thương biểu mô giác mạc
- Rụng tóc, gãy tóc
- Mụn trứng cá
- Bồi bổ cơ thể, cải thiện chức năng gan

Liều lượng và cách dùng:

- Liều thông thường là 2 - 4viên (1,0 g – 2,0 g) mỗi ngày, liên tục trong 2 – 3 tháng hay 10 – 20 ngày mỗi tháng.
- Người cao tuổi : liều chỉ định trên dùng cả trong trường hợp người cao tuổi
- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên : dùng ½ liều người lớn (1-2 viên/ngày)

Liều dùng và thời gian điều trị có thể được điều chỉnh bởi bác sỹ và tình trạng của bệnh nhân.

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc
- Suy thận nặng
- Hôn mê gan

Thận trọng:

- Không nên dùng cho bệnh nhân bị cystin niệu, trẻ em < 6 tuổi.
- Nên ngừng dùng thuốc khi bệnh về dạ dày, ruột.
- Thực hiện đúng theo phác đồ điều trị
- Trẻ em dùng thuốc phải có sự kiểm soát của người lớn
- Nếu các triệu chứng bệnh không cải thiện sau một tháng dùng thuốc, nên tham khảo ý kiến bác sỹ hay dược sĩ

Tác dụng không mong muốn
Đôi khi có các triệu chứng như buồn nôn, hiếm khi bị tiêu chảy, khát nước và đau dạ dày nhẹ. Vài trường hợp có thể tăng mụn trứng cá nhẹ ở giai đoạn đầu dùng thuốc, đây là tác dụng loại bỏ chất cặn bã ở da của thuốc và sẽ hết khi tiếp tục điều trị.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc:
Chưa có dữ liệu đầy đủ cho tương tác thuốc với thuốc khác.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Không ảnh hưởng.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Không ảnh hưởng

Quá liều và xử trí:
Chưa có ghi nhận về trường hợp quá liều.
Trong trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu bất thường do dùng thuốc quá liều, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc kịp thời.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 36 tháng từ ngày sản xuất

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM.
Nhà sản xuất

SĐK: VN-18418-14