

HAMOV

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
Nếu Cần Thêm Thông Tin Xin Hỏi Ý Kiến Của Bác Sĩ

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

- Thành phần hoạt chất:
 - Cao khô hỗn hợp dược liệu.....90 mg
 - (Tương ứng với: Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*).....150 mg
 - Nghệ (*Rhizoma Curcumae longae*).....150 mg
 - Hồ hoa (*Flos Styphnolobii japonici imaturi*).....150 mg
 - Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*).....300 mg

- Thành phần tá dược: Lactose, magnesi stearat, ethanol 96% vừa đủ 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

MÔ TẢ DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng số 0, hai đầu màu đỏ. Bên trong chứa bột thuốc màu nâu đen, thơm mùi dược liệu.

TÁC DỤNG: Thuốc làm giảm lipid máu (cholesterol, triglyceride) nên chống xơ vữa động mạch.

CHỈ ĐỊNH: Hỗ trợ điều trị chứng tăng mỡ máu (cholesterol, triglyceride), xơ vữa động mạch thường gặp trong các bệnh rối loạn chuyển hóa kèm theo mỡ máu cao như: cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, béo phì.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần. Uống sau bữa ăn

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai: Thuốc này không dùng cho phụ nữ có thai

Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH

MÁY MÓC: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa thấy tác dụng không mong muốn. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ THUỐC:

Tương tác thuốc: Khi dùng thuốc không ăn thức ăn có nhiều cholesterol: lòng heo, tôm, óc, tim...

Tương kỵ thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

QUÁ LIỀU:

- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Nôn nao, khó chịu
- Cách xử trí khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều thì ngừng và giảm liều.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 60 viên nang cứng, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CƠ SỞ SẢN XUẤT:  **CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN**

231 Chiến Lược, KP.18, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

Sản xuất tại: Đường số 3, Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - ĐT: (028) 37624848, Fax: (028) 37624848

Website: www.vanxuanpharma.com.vn