



EAGLE BRAND MUSCLE RUB DẦU XOA BÓP CON Ó

1/ Thành phần:

Mỗi gam dầu Xoa Bóp Con Ó có chứa:

Hoạt chất chính:	
Methyl Salicylate	40%
Menthol	12.5%
Camphor	12.5%

2/ Dạng bào chế:

Dầu Xoa Bóp Con Ó (Thuốc dùng ngoài).

3/ Chỉ định:

Giảm đau các cơn đau cơ và khớp do đau lưng, viêm khớp, bong gân và các cơn đau cơ do căng cứng cơ bắp.

4/ Liều dùng và cách dùng:

Bôi một lượng thuốc thích hợp lên vùng da bị đau không quá 3 đến 4 lần trong ngày.

5/ Chống chỉ định:

Chống chỉ định cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

6/ Thông tin cảnh báo và phòng ngừa (Thận trọng):

- CHỈ SỬ DỤNG NGOÀI DA.

- Không thoa lên vết thương hở, hoặc vùng da bị trầy xước hoặc dễ bị kích ứng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và màng nhầy.
- Nếu triệu chứng đau vẫn còn sau 7 ngày, ngưng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến của bác sĩ.
- Trong trường hợp uống nhầm, cần sự trợ giúp của chuyên gia y tế.
- Thận trọng khi dùng cho trẻ lớn hơn. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mũi của trẻ em. Có thể gây suy hô hấp đột ngột.

- ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

7/ Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác:

Sản phẩm có chứa methyl salicylate, vì vậy có thể hấp thu qua da vào máu. Đối với bệnh nhân đang dùng warfarin, một lượng lớn dầu xoa lên da có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

8/ Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có kết quả nghiên cứu về tính an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai; hãy trao đổi bác sĩ để tư vấn về nguy cơ và lợi ích của việc dùng thuốc trong thời gian mang thai. Chưa biết được liệu sản phẩm đi vào sữa mẹ hay không, hãy tư vấn bác sĩ trong thời gian dùng thuốc khi đang cho con bú.

9/ Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có báo cáo.

10/ Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Sản phẩm này có thể gây dị ứng trên một số người sử dụng. Thử nghiệm trên da ở một phạm vi nhỏ trước khi sử dụng.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11/ Quá liều và cách xử trí:

Quá liều Methyl salicylate:

Nhiễm độc salicylate có thể xảy ra sau khi uống hoặc bôi methyl salicylate. Nhiễm độc mãn tính thường xảy ra khi sử dụng lặp lại liều lớn hoặc bôi quá nhiều salicylate.

Các triệu chứng bao gồm: chóng mặt, ù tai, ra mồ hôi, buồn nôn, ói mửa, và rối loạn tâm thần. Các triệu chứng trên có thể được kiểm soát bằng cách giảm liều sử dụng.

Các triệu chứng nhiễm độc nặng hoặc quá liều cấp tính sau ngộ độc bao gồm: tăng thông khí phổi, sốt, ketosis và nhiễm kiềm hô hấp và toan chuyển hóa. Suy nhược hệ thần kinh trung ương có thể dẫn đến hôn mê, trụy tim mạch và suy hô hấp.

Quá liều menthol:

Nuốt phải một lượng lớn là nguyên nhân gây ra các triệu chứng: buồn nôn, nôn mửa, đau bụng dữ dội, chóng mặt, mất điều hòa vận động, mê sảng, giật cơ, co giật và cơn động kinh, trầm cảm và hôn mê. Có thể gây suy hô hấp tức thời cho trẻ nhỏ nếu bôi dầu trực tiếp lên mũi.

Cách xử trí: Ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ càng sớm càng tốt ngay khi các triệu chứng trên xuất hiện.

12/ Điều kiện bảo quản:

Để nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C.

13/ Quy cách đóng gói:

Hộp 1 chai 85ml, 30ml.

14/ Hạn sử dụng:

60 tháng kể từ ngày sản xuất. (Vui lòng xem mặt ngoài vỏ hộp hoặc mặt sau chai dầu). Không được dùng thuốc quá hạn sử dụng được ghi trên bao bì.

15/ Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

16/ Sản xuất bởi:

Borden Co. (Pte) Ltd.

No. 9, Jalan Kilang, Borden Centre, Singapore 159409, Singapore.

Tel: +65 6272 6022

Email: enquiry@bordeneagle.com.sg

Fax: +65 6273 1328

Website: www.bordeneagle.com.sg

17/ Phân phối bởi:

Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương.

Địa chỉ: Số 18 L1-2 VSIP II, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3815 062

Fax: (0650) 3815 063