

RHAMINAS

Viên nén bao phim

CÔNG THỨC:

Glucosamine sulfate (dưới dạng glucosamine sulfate sodium chloride)..... 500mg
tương đương glucosamine.....392,6mg
Chondroitin sulfate sodium.....400mg
Tá dược vừa đủ.....1 viên

(Povidone, microcrystalline cellulose, acid citric monohydrate, sodium lauryl sulfate, talc, magnesium stearate, hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, polyethylene glycol 6000, oxide sắt vàng, oxide sắt đỏ, erythrosine).

TÍNH CHẤT:

- Glucosamine là một amino-monosaccharide, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan tham gia quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Khi vào trong cơ thể nó kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là mucopolysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Glucosamine đồng thời ức chế các enzyme phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A2 và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sinh sụn. Glucosamine còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương.

- Do glucosamine làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamine không những giảm triệu chứng của thoái hóa khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

- Đó là thuốc tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái hóa khớp, điều trị các bệnh thoái hóa xương khớp cả cấp và mạn tính, có đau hay không có đau, cải thiện chức năng khớp và ngăn chặn bệnh tiến triển, phục hồi cấu trúc sụn khớp.

- Chondroitin là một acid mucopolysaccharide, đó là thành phần chiếm tỷ lệ lớn trong mô sụn. Được kết hợp với glucosamine để hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ tế bào ở xương, khớp, và các rối loạn mô liên kết.

- Trong thoái hóa khớp: chondroitin ức chế elastase, yếu tố trung gian trong quá trình thoái hóa mô sụn, đồng thời kích hoạt quá trình tổng hợp proteoglycan bởi các tế bào sụn.

CHỈ ĐỊNH:

- Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.
- Hỗ trợ điều trị thoái hóa sụn, giúp tái tạo sụn.
- Hỗ trợ điều trị tổn thương các khớp và làm tăng tiết dịch khớp.

CÁCH DÙNG:

- Dùng cho người trên 18 tuổi: mỗi lần 1 viên, ngày uống 3 lần.
- Ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với glucosamine sulfate, chondroitin sulfate sodium hoặc thành phần khác của thuốc.

- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

THẬN TRỌNG:

- Tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau, chống viêm trong những ngày đầu.

- Người có tiền sử mẫn cảm với tôm, cua nên thận trọng khi sử dụng thuốc này.

- Bệnh nhân tiểu đường nên theo sự hướng dẫn của bác sĩ khi uống thuốc này, vì nó có khả năng tác động vào các enzyme cần thiết để duy trì lượng đường huyết.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Tác dụng không mong muốn của thuốc rất hiếm, nếu có thường nhẹ và thoáng qua như đầy hơi, tiêu chảy hoặc buồn nôn.

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Glucosamine sulfate có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, hậu quả là tác động trên dung nạp đường, tránh sử dụng đồng thời với warfarin vì ảnh hưởng đến hiệu quả chống đông.

- Chondroitin sulfate sodium làm tăng tác dụng chống đông máu của các thuốc chống kết tập tiểu cầu và các thuốc kháng đông.

- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sĩ về những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:

Vi 10 viên nén bao phim. Hộp 3 vi.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam