

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/1/6/2014

Composition:
Each soft capsule contains:
Calcium carbonate...750mg
Cholecalciferol.....100IU

Indications:
CALEDO is used in calcium deficiency, children during periods of rapid growth, pregnancy and lactation, osteoporosis in old age, patients during treatment with corticoids.

Administration, contra-Indications: See insert paper

Storage: In well-closed container, below 30°C, protect from light

Package: 20 blisters x 5 soft capsules/box

Keep out of reach of children.
Read insert paper carefully before use.

PHIL PHIL INTER PHARMA
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HĐ:

20 blisters x 5 soft capsules



Thành phố Hồ Chí Minh
Mã Vennang mien chua
Caici b...750mg
Cholecalciferol...100IU

Chỉ định:
CALEDO được dùng trong trường hợp thiếu calci, trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai và cho con bú, loãng xương ở người già, bệnh nhân đang dùng corticoid.

Cách dùng, chống chỉ định:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản:
Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Đóng gói: 20 vỉ x 5 viên nang mềm/hộp

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại: CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương



20 vỉ x 5 viên nang mềm






Số lô SX, HD sẽ dập trên vỉ



*Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.*

CALEDO

SĐK:



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

Calci carbonat 750 mg
Cholecalciferol 100 I.U

Tá dược: Dầu đậu nành, Dầu lecithin, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Manatol 7020, Ethyl vanillin, Titan dioxyd, Nước tinh khiết, Màu vàng số 5, Màu đỏ số 40, Màu xanh dương số 1, Màu vàng số 203.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH

CALEDO được dùng trong trường hợp thiếu calci, trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai và cho con bú, loãng xương ở người già, bệnh nhân đang dùng corticoid.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

CALEDO được dùng bằng đường uống.

- *Người lớn:* 1 viên x 3 lần mỗi ngày.

- *Trẻ em:* 1 viên x 2 lần mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Rung thất trong hồi sức tim, tăng calci máu, nhiễm độc vitamin D, sỏi thận và suy thận nặng, người bệnh đang dùng digitalis, epinephrin, u ác tính tiêu xương, calci niệu nặng, loãng xương do bất động.

Bệnh nhân quá mẫn với vitamin D hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân bị bệnh tim hoặc Sarcoidosis.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Calci làm giảm sự hấp thu của các thuốc tetracyclin, enoxacin, fleroxacin, levofloxacin, lomefloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, sắt, kẽm, và những chất khoáng thiết yếu khác, nên dùng thuốc cách nhau ít nhất 3 giờ.
- Thuốc lợi tiểu thiazid, verapamil: gây tăng calci huyết.
- Clopamid, ciprofloxacin, clorthalidon, thuốc chống co giật ức chế thải trừ calci qua thận.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai

Nếu sử dụng vitamin D với liều lớn hơn liều bổ sung hàng ngày đã được khuyến cáo cho người mang thai bình thường (400 IU) có thể xảy ra nguy cơ, vì vậy không nên sử dụng vitamin D với liều lớn hơn liều bổ sung hàng ngày đã được khuyến cáo cho người mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Vitamin D tiết vào sữa, vì vậy không nên dùng vitamin D với liều lớn hơn liều bổ sung hàng ngày đã được khuyến cáo cho phụ nữ cho con bú (400 IU).

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Rối loạn tiêu hoá hiếm khi xảy ra (táo bón, đầy hơi).
- Ở liều cao, CALEDO có thể gây ra các triệu chứng của tăng calci huyết, tăng calci niệu như biếng ăn, buồn nôn, nôn, táo bón, khô miệng, đa niệu.

*** Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

QUẢ LIỀU

Triệu chứng

Nhịp tim bất thường, đau bụng, buồn nôn, nôn, khô miệng, có vị kim loại trong miệng, giảm ngon miệng, táo bón, suy yếu, đau đầu, mê sảng, choáng váng và hôn mê.

Điều trị

Chăm sóc cấp cứu nội khoa (thăm phân máu).

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

ĐÓNG GÓI: Hộp 20 vỉ x 5 viên nang mềm.



Handwritten signature

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng



Handwritten signature

